

НАРКОТИКИ

«В СВОБОДНОМ» ДОСТУПЕ»

(ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ)



В поисках «удовольствия» подростки находят для себя доступные и дешёвые способы. Многие родители не догадываются, что обезболивающие лекарства, находящиеся в домашних аптечках, их дети могут использоваться как альтернатива наркотикам для получения необычных ощущений. Периодически популярными в подростковой среде становятся лекарственные препараты, которые не содержат наркотические вещества и продаются в аптеках без рецептов.

При этом они вызывают сильную зависимость и серьёзные осложнения в организме подростка вплоть до смертельного исхода.

Триган Д — распространённое лекарственное средство, которое подростки используют для достижения наркотического эффекта.

В медицинских целях Триган Д используют как обезболивающее и спазмолитическое средство.

Лекарство широко распространено на территории РФ. Из-за невысокой цены, доступности и выраженного болеутоляющего действия его часто покупают, не подозревая о негативной стороне приема препарата. Комбинация сильнодействующих компонентов в нем дает эффект, напоминающий наркотический — эйфорическое «опьянение», галлюцинации, изменение сознания, поэтому врачи предупреждают об опасности этого лекарства.

Основные действующие составляющие — парацетамол и дицикловерин. Сочетание «парацетамол-дицикловерин» многократно усиливает действие второго компонента — сильного спазмолитика, который блокирует рецепторы. Парацетамол – известное жаропонижающее средство. В одной таблетке Триган Д его содержится 500 мг. Печень необратимо поражается при получении 10-12 гр. парацетамола.

Используя Триган Д для достижения наркотического эффекта, подросток подвергает свое здоровье большой опасности. Передозировка Триган Д

вызывает сначала эйфорию. Затем появляются галлюцинации, которые выглядят как шизофренический бред.

Галлюцинации могут быть негативными, слуховыми и визуальными, которые вызывают не только паранойяльный бред, но и панику.

Триган Д — изменяет структуру клеток головного мозга. Последствия его приёма непредсказуемы — вплоть до психических заболеваний, отказа работы печени, коматозного состояния.

Симптомов отравления:

- «стеклянные глаза»,
- блуждающие боли в ЖКТ,
- тошнота и рвота,
- эйфория, которую сменяет сонливость

Триган - Д опасен своей мнимой безобидностью. При постоянном его употреблении развивается сильная психологическая зависимость. Подросток, переставший употреблять таблетки, испытывает **апатию, раздражительность вплоть до депрессивного состояния.**

В сочетании с алкоголем эффект усиливается и становится менее предсказуемым. При этом такое опьянения может продолжаться длительное время.

Внешние признаки употребления лекарственного средства:

- нарушенная координация движения.
- расширенные зрачки.
- вялость.
- невнятная речь.
- в некоторых случаях паранойя или панические атаки.

При постоянном злоупотреблении лекарственного препарата, развиваются патологические процессы организма:

- **ухудшение или полная утрата зрения.**
- **патологии печени.**
- **судороги и паралич конечностей.**
- **острая почечная недостаточность**
- **тахикардия и нарушение**
- **сердечного ритма**
- **желудочно-кишечные кровотечения.**
- **сухость кожи и аллергические реакции**
- **недержании мочи.**

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!!!