

## Профилактика гриппа птиц

Грипп птиц – это острая заразная болезнь, которая поражает органы пищеварения, дыхания птиц и сопровождается высокой смертностью.

Вирус гриппа поражает сельскохозяйственных, диких и обитающих вблизи жилья человека (синантропных) птиц. Болезнь передается воздушно-капельным, пищевым путём и через яйцо. Вирус также может передаваться через предметы ухода, оборудование, тару, тушек птиц, перо, помёт. От момента заражения до проявления первых клинических признаков болезни проходит от одного до семи дней. Снижается яйценоскость, уменьшается аппетит, нарастает жажда, появляются слизистые истечения из носовых отверстий, дыхание – хриплое.

Для предупреждения заражения гриппом птиц в личных подсобных хозяйствах необходимо проводить профилактические мероприятия, которые осуществляется владельцами птицы комплексно, включают мероприятия организационно-хозяйственного характера - соблюдение владельцами санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм. В частности, необходимо:

- Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.

- Не допускать выгула домашней птицы за пределами дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами.

- Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

- Проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: периодически обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бады) 3-х процентным горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью.

- Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Исключить возможность попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы. Пищевые отходы перед скормливанием необходимо прокипятить.

В период угрозы гриппа птиц:

- Для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных хозяйствах граждан необходимо всех домашних птиц перевести на закрытое содержание.

- Оборудовать приспособления для обеззараживания обуви в виде ванночек или дезинфекционных ковриков у входа в птичник.

- Не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы.

- Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории необходимо в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь).

- Вся рабочая одежда должна подвергаться дезинфекции (замачивание в 3% растворе хлорамина Б в течение 30 минут, кипячение в 2% растворе соды кальцинированной) и последующей стирке.

- При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных хозяйствах граждан необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу района в целях проведения необходимых мероприятий по исследованию птицы на грипп.

Руководитель БУВО «Россошанская райСББЖ» Е.Н. Кунахов